

お知らせ

課名	疾病感染症対策課
担当	藤田、松岡
内線	3365、3368
直通	226-7331

百日咳の患者報告が急増しています（注意喚起）

県内において百日咳の患者報告数が、第15週（4月7日から4月13日）に53人、第16週（4月14日から4月20日）に49人報告（4月23日時点）され、直近の2週間で100人以上の報告がありました。令和7年の累積報告数は227人となり、昨年の年間報告数である19人を大きく上回っています。特に4月に入ってから、過去に例を見ないペースで患者報告が急増している状況にあり、今後もさらに増加の可能性があることから、次のとおり県民への注意喚起を図ります。

1 百日咳とは（2018年から5類全数把握対象）

【原因】 百日咳菌

【症状】 ・最初はかぜ様症状で始まり、次第に咳が激しくなっていく、特有のけいれん性の激しい咳発作が出始めます。

- ・発熱は無いが、微熱程度のことが多いです。
- ・症状が出始めてから2～3か月で回復します。
- ・乳児（特に新生児や乳児期早期）では重症化し、肺炎・脳症を合併することにより、まれに死に至ることもあります。

【感染経路】 咳やくしゃみなどの飛沫による感染、接触による感染

2 感染予防のためには

【基本的な感染防止策】

- ・飛沫感染を予防するためには、咳などの症状がある時には、マスクをするなどの咳エチケットが有効です。
- ・手に付着した菌による接触感染を予防するためには、石けんと流水による手洗いが有効です。

【予防接種】

- ・乳児での重症化を予防するためには、定期接種の対象で、生後2か月から接種可能な5種混合ワクチン（百日咳ワクチンを含む）等の接種が有効です。

3 注意すべきこと

- ・現在、患者報告の多くは5～14歳に集中しているため、学校等の集団生活の場における感染拡大に注意が必要です。
- ・成人が感染した場合、典型的な激しい咳が出ない場合もあり、気づかずに重症化リスクの高い乳児等への感染源となってしまうこともあるため注意が必要です。

4 かかったときは

- ・ 生後6か月以上の場合は、抗菌薬による治療が検討されます。また、咳が激しい場合には咳止め等の対症療法が行われることがあります。
- ・ 特に重症化しやすい乳児等、気になる症状があるときは早めに医療機関を受診しましょう。


(参考)

県内の百日咳患者報告数掲載ホームページ（毎週更新）


岡山県感染症情報センター(<https://www.pref.okayama.jp/page/565068.html>)

岡山県における百日咳患者報告に関する情報（5月14日時点）

百日咳患者の累積報告数の推移



2025年の百日咳患者の年齢別報告状況



百日せきにご注意ください

百日咳菌の感染によって、激しいせきの特徴とする急性の気道感染症です。

乳幼児では、激しいせきによる

無呼吸発作

むこきゅうほっさ

チアノーゼ

顔色や唇、爪の色が紫色に見える状態



けいれん

呼吸停止

に進展することがあります。

こんな症状がみられます

カタル期（約2週間持続）
かぜ症状で始まり、次第に咳の回数が増えて程度も激しくなります。

▼
けいがい


痙咳期（約2～3週間持続）
発作性、けいれん性の咳が出るようになります。合併症として肺炎や脳症などもあり、乳児では注意が必要です。

▼

回復期
激しい発作は次第に減衰し、やがて回復に向かいます。回復まで、全経過で約2～3か月かかります。

予防と対策

百日せきの予防には、生後2か月から定期接種として接種可能な5種混合ワクチン（DPT-IPV-Hib）等の接種が有効です。ただし、接種後年数が経過した人等での発病も見られます。マスク着用、手洗いなどの基本的な感染症対策を心がけましょう。



せきが続く場合は、医療機関の受診をご検討ください。

受診を迷った場合や夜間・休日の場合は、「こどもの救急 <https://kodomo-qq.jp/>」のサイトを参照したり、「#8000（こども医療電話相談）」にご相談ください。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください

